

Gebrauchsinformation



B-Vetsan

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere (Pferd, Rind, Schwein, Hund)

Zusammensetzung

100 g Mischung enthalten:

Kalium arsenicosum Trit. D6 (HAB 1, Vorschrift 5a) 10,0 g, Ammonium arsenicum Trit. D6 (HAB 1, Vorschrift 5a) 10,0 g, Kalium nitricum Trit. D3 10,0 g, gemeinsam potenziert über die letzte Stufe gemäß HAB 1, Vorschrift 40c.

Sonstiger Bestandteil: Lactose.

Darreichungsform und Inhalt

300 g/800 g Mischung zum Eingeben

Pharmazeutischer Unternehmer

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung und Dauer der Anwendung

Folgende Angaben gelten, soweit vom Tierarzt nicht anders verordnet:

Einzeldosis:	Pulver	Meßlöffel (ca.)
Hund	1 -2 g	1/2
Kalb	2 g	1/2
Rind/Pferd	4 g	1

Die angegebene Dosis wird 2-3mal täglich verabreicht. Jungtiere erhalten die Hälfte der angegebenen Dosis.

Das Pulver unvermischt, mit Futter vermischt oder in Wasser aufgelöst eingeben.

Einzeldosis Schwein	Pulver	Meßlöffel (ca.)
ausgewachsene Sau/Eber	2 - 4 g	1/2 - 1
Endmastschweine	1 - 2 g	1/4 - 1/2
Mittelmastschweine	1 - 1,5 g	
Vormast/Läufer	0,5 - 1 g	
Ferkel	0,5 - 1 g	

Bei Schweinen richtet sich die Dosierung nach der Art der Verabreichung. Bei einer Einzeltierbehandlung wird die obere Grenzdosis 2-3mal täglich gegeben. Bei einer Bestandsbehandlung wird pro Tier die untere Grenze der Dosis 1mal täglich über das Trinkwasser verabreicht, dazu kann 1 kg Pulver in 3000 l Trinkwasser gelöst werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

Nebenwirkungen

Bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen kann es zur homöopathischen Erstreaktion kommen, was mit der zeitweisen Verschlimmerung von Symptomen einhergeht. Diese Erscheinung ist unbedenklich und bedeutet in der Regel keine Verschlimmerung des Krankheitsverlaufes. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Tierarzt zu konsultieren.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Wartezeit

Pferd, Rind, Kalb, Schwein

Eßbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Datum der Fassung der Packungsbeilage

März 1998

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 300 g und 800 g Mischung.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 31733.00.00