

Wichtige Information, aufmerksam lesen!

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
www.dhu.de



Pulsatilla D4 ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml enthält:

Wirkstoff: Pulsatilla Dil. D4 5 ml (isotonisch).

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die Lösung ist subkutan zu injizieren.

Dosierung, soweit vom Tierarzt nicht anders verordnet:

Katze:	0,5 – 1 ml
Hund:	1 – 2 ml
Schaf/Ziege:	2 – 3 ml
Schwein:	5 ml
Pferd/Rind:	8 – 10 ml

Die angegebene Dosis sollte einmal täglich appliziert werden. Als Anfangsbehandlung bei perakuten Erkrankungen kann die Dosis auch mehrmals täglich injiziert werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

Hinweise für die richtige Anwendung

Subkutane Injektionen sollten von Tierhaltern erst nach entsprechender fachlicher Unterweisung durch den Tierarzt vorgenommen werden.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum von ca. 30 Minuten zu beobachten, um bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sofort den Tierarzt verständigen zu können.

Wartezeit

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege:

Eßbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden.

Anwendung während der Trächtigkeit und der Laktation

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Datum der Fassung der Packungsbeilage

Juli 2007

Darreichungsform und Packungsgrößen

Flüssige Verdünnung zur Injektion.

20 (2x10) Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig